

Nerandomilast (Jascayd®) (EE. UU. solamente)



pulmonaryfibrosis.org

¿Qué es el nerandomilast?

El nerandomilast es un medicamento oral aprobado para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y las enfermedades pulmonares intersticiales crónicas en las que la fibrosis continúa progresando, un proceso que se conoce como fibrosis pulmonar progresiva (FPP). En ensayos clínicos, se ha demostrado que el nerandomilast ralentiza la progresión del deterioro de la función en la FPI.

¿Cómo actúa el nerandomilast?

El nerandomilast actúa interfiriendo con la vía que crea tejido cicatricial (fibrosis) e inflamación en el tejido pulmonar. El nerandomilast no mejora la función de los pulmones, sino que la enfermedad progresa más lentamente a lo largo del tiempo.

¿Quién debe tomar nerandomilast?

La FDA ha aprobado el uso del nerandomilast para pacientes adultos con FPI y FPP. Solo usted y su proveedor de atención médica pueden determinar el mejor enfoque para el tratamiento de su afección. Le recomendamos que consulte a su proveedor de atención médica para determinar si este fármaco es adecuado para usted. Algunos pacientes pueden decidir no tomar este medicamento después de considerar los posibles beneficios y efectos secundarios.

¿Cómo se debe tomar el nerandomilast?

El nerandomilast está disponible en comprimidos de 18 mg y 9 mg. La dosis habitual es de 18 mg por vía oral dos veces al día, con aproximadamente 12 horas de diferencia. La dosis se puede reducir a 9 mg dos veces al día a criterio del proveedor de atención médica responsable del tratamiento. Si también está tomando pirfenidona, solo debe tomar la dosis de 18 mg de nerandomilast. Este medicamento puede tragarse entero o disolverse en agua y puede tomarse con o sin alimentos.

¿Cómo puedo obtener el nerandomilast?

El nerandomilast solo está disponible mediante receta médica a través de una farmacia especializada. Se requiere una autorización previa. La autorización previa es el proceso mediante el cual su equipo de atención sanitaria solicita la aprobación de la compañía de seguros para recetarle el medicamento. Una vez aprobada la autorización previa, la farmacia especializada coordinará con usted para enviarle por correo el medicamento a su casa o coordinar su recogida.

¿Mi seguro pagará el nerandomilast?

La cobertura del seguro variará según la aseguradora y su póliza individual. Le recomendamos que se comunique directamente con su proveedor del seguro para determinar su cobertura específica. El proveedor de nerandomilast ha establecido programas para ayudar a los pacientes a pagar sus medicamentos. Puede ponerse en contacto con **CareConnect4Me™** en el 1-844-527-2293. Le recomendamos comunicarse con estos programas directamente, ya que también le ayudarán a trabajar con su compañía de seguros.

También hay varias organizaciones que pueden ayudar a aquellas personas que viven con fibrosis pulmonar y tienen problemas financieros y de seguro. Puede ponerse en contacto con **Accessia Health** en el 1-800-366-7741, la **HealthWell Foundation** en el 1-800-675-8416, la **Patient Advocate Foundation** en el 1-800-532-5274 o **The Assistance Fund** en el 1-855-845-3663 para obtener más información y saber si pueden brindar asistencia.

¿Qué efectos secundarios pueden producirse con el uso de nerandomilast?

Los efectos secundarios frecuentes incluyen diarrea, COVID-19, infección de las vías respiratorias superiores, depresión, disminución del peso y del apetito, náuseas, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, dolor de espalda y mareos.

¿Cómo me monitoreará mi médico mientras estoy tomando el nerandomilast?

Si tiene efectos secundarios, su proveedor de atención médica podría agregar otros medicamentos, ajustar su dosis o interrumpir de forma temporal o permanente el nerandomilast.

¿Puedo tomar nerandomilast si ya estoy tomando nintedanib o pirfenidona?

El nerandomilast se estudió en pacientes que recibían nintedanib y en pacientes que recibían pirfenidona. Hable con su proveedor de atención médica si debe tomar nerandomilast solo o en combinación con nintedanib o pirfenidona. Los pacientes que toman pirfenidona solo deben tomar la dosis de 18 mg de nerandomilast debido a una interacción farmacológica.

¿Qué interacciones farmacológicas debo conocer?

Debido a una interacción entre pirfenidona y nerandomilast que reduce los niveles de nerandomilast en el organismo, los pacientes que usan pirfenidona solo deben tomar la dosis más alta, 18 mg, de nerandomilast.

Algunos medicamentos, como ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, claritromicina, eritromicina, diltiazem y verapamilo, pueden aumentar los niveles de nerandomilast. Si está tomando uno de estos medicamentos, debe hablar con su proveedor de atención médica si es necesario hacer algún ajuste.

La rifampicina, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital y la hierba de San Juan pueden reducir la eficacia del nerandomilast. Hable con su proveedor de atención médica si está tomando alguno de estos medicamentos.

¿Hay personas que no deben tomar nerandomilast?

El nerandomilast no se recomienda en pacientes con nefropatía terminal o enfermedad hepática grave. Las mujeres que estén embarazadas, planeando un embarazo o amamantando deben consultar a su proveedor de atención médica en relación con el uso del nerandomilast.

Agradecimientos

La Pulmonary Fibrosis Foundation agradece a las siguientes personas por su asistencia en la redacción y revisión de esta hoja informativa.

Dra. Amy Hajari Case, MD, FCCP

Directora médica, Pulmonary Fibrosis Foundation

Jamie Lederer, MSN, CRNP

Directora de divulgación, Asuntos Clínicos de PFF